

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F. respiratoire | | | | | | | | | | | | | |
| Saturation | | | | | | | | | | | | | |
| O ² / AA | | | | | | | | | | | | | |
| Selles | | | | | | | | | | | | | |
| Poids | | | | | | | | | | | | | |
| Initiales | | | | | | | | | | | | | |

Inscrire dans cette section, la fréquence respiratoire sur une minute.
 Inscrire le résultat de la saturation dans la deuxième case sans ajouter la mention %.
 Inscrire dans la case O²/AA si la saturation a été prise à l'air ambiant ou avec de l'oxygène. Inscrire AA sans oxygène ou le nombre de litres/minute si l'oxygène est en fonction.

À la fin de votre quart de travail, vous indiquez une seule fois dans cette section le nombre de selles du patient.
 Si le poids a été repris dans la journée, on le note dans cette section.
 Inscrire vos initiales dans la dernière case.

Erreur d'inscription des signes vitaux

Si une erreur se produit, lors de l'inscription de la T°, on la corrige en la mettant entre parenthèses, on inscrit erreur et on initiale.

Si une erreur se produit, lors de l'inscription de la T.A., on la corrige en tirant une ligne, on inscrit erreur et on initiale.

Fréquence de la prise des signes vitaux

Il revient à l'infirmière d'exercer son jugement pour déterminer quand et à quelle fréquence évaluer les S.V. d'une personne, en fonction de son état de santé.
 Les évaluations prescrites par le médecin devraient être considérées comme un minimum ; l'infirmière mesurera les S.V. aussi souvent que l'état de santé de la personne l'exige.