

Test sur les médicaments du système cardiovasculaire

Les bêtabloquants servent à traiter :

- l'hypertension artérielle
- l'asthme
- les péricardites
- l'insuffisance cardiaque
- les arythmies cardiaques (battements irréguliers)
- les douleurs thoraciques (angine)

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents des bêtabloquants ?

- les hypotensions
- fatigue
- hypokaliémie

Parmi les suivants, choisir les soins infirmiers reliés à l'administration des nitrates :

- prendre la pression artérielle avant chaque administration de nitro s.l.
- Changer la patch de nitro chaque 72 heures
- Ne pas administrer si la TA \leq 120/80
- Alternier les sites pour l'application du timbre cutané

La warfarine (coumadin) peut provoquer des effets secondaires tels que :

- des saignements abondants
- des ecchymoses
- du pyrosis
- des hypotensions

Pour les diurétiques, quels conseils devez-vous transmettre dans les choix suivants :

- encourager la personne à limiter sa consommation de sel
- dire d'augmenter la quantité de liquide ingéré
- aviser que le furosémide peut rendre la peau plus sensible à la lumière du soleil
- conseiller de prendre le diurétique au coucher
- conseiller à la personne de se peser régulièrement

Donnez l'effet recherché pour les classes de médicaments suivants :

- diurétiques _____
- cardiotoniques _____
- nitrates _____
- hypocholestérolémiant _____
- bêtabloquants _____
- antihypertenseurs _____